

[var. *alieno-brunnea*] : Bruna, mandibole e membri rossi (FOREL).

4. Nera, lucidissima, colore e pubescenza come nella ♀, cui rassomiglia molto; peli più lunghi. Ali tinte di bruno fino alla metà. L. 6-6,8 mm. *F. fuliginosa*.
- Più chiara; tegumento pubescente. Palpi mascellari come in *F. flava*. 5.
5. Squama piccola, bassa, col margine ottuso e non inciso. Tibie e scapi senza peli eretti. Colore testaceo-bruno, gastro più scuro. Ali lunghe, tinte leggermente di giallo bruniccio alla base. L. 3-3,6 mm. *F. carniolica*.
- Più grande, squama più alta, col margine assottigliato ed acuto. Corpo bruno, bocca, antenne e zampe testacee. Ali più o meno intensamente tinte di bruno nella metà basale 6.




Fig. 32. — Squame di *F.* del gruppo *umbrata*, ♀: 1, *umbrata*; 2, *mixta*; 3-6, *bicornis*, diverse forme: 3, *distinguenda*; 4, *affinis*; 5, *bicornis* di Lombardia (2 esemplari di diversa grandezza); 6, *bicornis* di Napoli.

6. Tibie con peli eretti numerosi; torace e gastro copiosamente pelosi. Funicolo delle antenne più sottile che in *F. mixta*. Squama rettangolare, non ristretta al margine superiore incisa più o meno profondamente. L. 7-8 mm. *F. umbrata*.
- Tibie senza peli o con scarsi peli. 7.
7. Antenne come nella specie precedente. Squama alta all'incirca come in detta specie, più o meno profondamente incisa e distintamente ristretta in alto *F. bicornis*.